

Broedcodes; criteria van broedzekerheid

Code Omschrijving

- 1 Waarneming van een volwassen individu in mogelijk broedbiotoop, zonder aanwijzing omtrent broeden.
 - 2 Eenmalige waarneming van zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop.
 - 3 Waarneming tussen de datumgrenzen van een paar in geschikt broedbiotoop.
 - 4 Territoriumgedrag (zang, gevechten e.d.) op dezelfde plaats vastgesteld, op tenminste 2 dagen die minimaal 10 dagen uit elkaar liggen.
 - 5 Baltsend paar (ook paring) in geschikte broedbiotoop. Het voeren van een wijfje door het mannetje moet eveneens met code 5 worden aangegeven.
 - 6 Bezoek van vogel aan een waarschijnlijke nestplaats, zoals Huismus die onder dakpannen kruipt.
 - 7 Angstkreten of ander gedrag (alarmeren), dat wijst op aanwezigheid van een nest of jongen. Houd er echter rekening mee dat alarmeren lang niet altijd duidt op een broedgeval. Veel vogels alarmeren ook wanneer ze niet broeden. Let daarom speciaal op of de vogel aan een bepaalde plaats is gebonden.
 - 8 Vogel met broedvlekken (niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor een broedgeval ter plaatse).
 - 9 Transport van nestmateriaal, nestbouw of uithakken/graven van nestholte.
 - 10 Afleidingsgedrag. De vogel doet alsof hij verlamd of gewond is, en lokt zo de waarnemer weg van het nest. Afleidingsgedrag komt vooral voor bij soorten die in open terreinen broeden, zoals eenden, steltlopers en een enkele zangvogel, zoals Rietgors.
 - 11 Pas gebruikt nest of eierschalen.
 - 12 Pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of uitgevlogen donsjongen van nestvlieders. Deze code moet uiterst zorgvuldig worden gehanteerd. Soorten als sterns, meeuwen, zwaluwen, Roek, Spreeuw, Kruisbek, Sijs en Kleine Barmsijs kunnen met hun vliegvlugge jongen grote afstanden afleggen. De jongen worden dan soms nog door de ouders gevoerd. Let daarom uitsluitend op jongen die niet of nauwelijks kunnen vliegen.
 - 13 Gebruikt nest met onbekende inhoud. Bezoek door ouders aan een nest waarvan de inhoud niet kan worden vastgesteld, of waarneming van broedende vogel. Deze code is onder meer bedoeld voor in kolonies broedende vogels zoals Roek en Oeverzwaluw.
 - 14 Transport voedsel of ontlasting. Transport van ontlastingspakketjes van of voedsel voor de jongen is voor de meeste zangvogels een bruikbare code. Bedenk echter dat meeuwen, roofvogels en sommige andere soorten hun jongen nog lang na het uitvliegen voeren (zie ook code 12) terwijl sterns en IJsvogel soms lange voedselvluchten maken, en dus best met voedsel buiten het broedgebied kunnen worden waargenomen. Het voeren van een wijfje door het mannetje moet met code 5 worden aangegeven.
 - 15 Nest met eieren.
 - 16 Nest met jongen gezien, of de jongen in het nest gehoord.
- N.B. Code 4 is niet bij veldbezoeken van toepassing, wel bij het invullen van het formulier aan het eind van het seizoen.

De meeste broedvogelwaarnemingen vallen onder enkele veel voorkomende broedcodes:

1. (Bijv. Bruine Kiekendief die laag over het riet vliegt in het voorjaar).
2. (Bijv. zingende Gekraagde Roodstaart in een rijk begroeide parkachtige tuin).
3. (Bijv. paartje Grauwe Gans dat eind maart op een met riet omzoomde plas zwemt).
4. (Bijv. een zingende Heggenmus op 2 verschillende dagen in het voorjaar op 'n bijna identieke locatie).
12. (Bijv. een familie pas uitgevlogen Koolmezen met korte staartjes, of 'n Dodaars met piepende kuikens).
14. (Bijv. Merel met voer in de snavel op het gazon).

Voorbeelden van notaties in het veld:

Volwassen individu in broedbiotoop	<u>X</u>	Paar in broedbiotoop	<u>X</u>
Territoriumindicerend (zang, balts, dreigen)	X	Nestindicerend (nestbouw, alarm, met voer)	(X)